

## Preparación de Colonoscopia con Golytely/Trilyte/Colyte

Deberá recoger su preparación en la farmacia lo más antes posible. La farmacia solo retendrá la receta durante 6 días después de recibirla.

### 5 días antes de su colonoscopia:

- Deje de tomar Coumadin/Warfarina, Plavix/Clopidogrel, Brilinta/Ticagrelor y Effient/Prasugrel.
- NO** tome medicamentos que detengan la diarrea (**Loperamida, Imodium, Subsalicilato de Bismuto, Kaopectate o Peptobismol, etc.**).
- Si toma **analgésicos** (medicamentos para el dolor) o tiene problemas con el **estreñimiento**, se recomienda tomar 1-2 tapas llenas de **Miralax** diariamente.
- NO** tome suplementos de fibra como **Metamucil, Citrucel** o productos con **hierro** incluyendo multivitaminas.

### 2 días antes de su colonoscopia:

Deje de tomar Eliquis/Apixaban, Xarelto/Rivaroxaban, Pradaxa/Dabigatran

### 1 día antes de su colonoscopia:

Seguirá una **dieta de líquidos claros todo el día** (sin alimentos sólidos, productos lácteos y nada de alcohol). Beber en mínimo 8 onzas de líquidos claros cada hora después de despertar.

### LÍQUIDOS CLAROS PERMITIDOS:

Jugo de manzana o uva blanca sin pulpa	Agua, aguas saborizadas (nada rojo)
Té (sin crema o crema no láctea)	Soda (nada rojo)
Café (sin crema o crema no láctea)	Ginger ale
Bebida Crystal Light (nada rojo)	Paletas sabor de fruta (nada rojo)
Postres de gelatina (sin fruta o cobertura)	Kool-Aid (nada rojo)
Caramelo duro	Caldo de carne o pollo (puro caldo)
G2 Gatorade/Powerade (nada rojo)	

### Instrucciones de preparación:

Mezcle la solución la mañana de su preparación (el día antes de su examen) y refrigere antes de beber. Si su preparación vino con paquetes de sabor, puede agregarlos en este momento. **NO** agregue hielo, azúcar ni ningún otro saborizante a la solución. Utilice un popote para beber para ayudar con el sabor.

**\*\*Si tiene náuseas o vómitos, puede dejar de tomar la preparación por 1 hora y luego continúe. Si el vómito continúa durante varias horas, deje de beber la preparación y llame al médico de guardia al 770-836-9666 / operador del hospital. Si tiene heces formadas (popo formado) o tiene alguna inquietud después de su preparación, llame a la oficina.**

La solución de preparación intestinal se consumirá en dos partes.

## **PARTE 1 - 4:00PM la noche antes de su colonoscopia**

Bebe un vaso de 8 oz de preparación intestinal cada 15-20 minutos para un total de **8 vasos**. Continúe bebiendo líquidos claros.

## **PARTE 2 – 8:00PM la noche antes de su colonoscopia**

Bebe un vaso de 8 oz de preparación intestinal cada 15-20 minutos para un total de **8 vasos**.

**NO TOMES NADA DESPUES DE LA MEDIA NOCHE antes de su examen.** Puede cepillarse los dientes y hacer gárgaras, pero no trague ningún líquido. **(ESTO INCLUYE CHICLE, CAMELOS DUROS Y PRODUCTOS DE TABACO (ESPECIALMENTE TABACO ORAL)).**

\*Si toma insulina, tome 1/2 de su dosis regular la noche anterior\*

### **Día del Examen:**

Puede cepillarse los dientes y hacer gárgaras, pero no trague ningún líquido. No tome nada por la boca. **(ESTO INCLUYE CHICLE, CAMELOS DUROS Y PRODUCTOS DE TABACO (ESPECIALMENTE TABACO ORAL))**. Si tiene dentaduras postizas, no las pegue y prepárese para quitárselas antes del examen. Por favor, deje TODAS las pertenencias personales (joyas, teléfonos celulares, billeteras, etc.) en casa o con su conductor. Los teléfonos celulares no están permitidos en el área del examen.

### **INSTRUCCIONES PARA MEDICAMENTOS:**

Por favor traiga una lista de todos sus medicamentos actuales, incluyendo cualquier medicamento de venta libre. Si usa **insulina o toma medicamentos para la diabetes**, no los tome la mañana del examen.

Si su examen es en **El Centro De Endoscopia**: Por favor, tome su medicamento para la presión arterial, convulsiones, ansiedad e inhaladores como de costumbre.

Si su examen es en cualquiera de **los hospitales de Tanner**: El hospital le dará instrucciones durante su llamada telefónica previa a la visita operatoria sobre qué medicamentos tomar y qué no tomar antes de su examen.

### **TRANSPORTE:**

Una persona responsable **DEBE ESTAR PRESENTE** con usted al llegar (Check-In) antes de su colonoscopia y **DEBE PERMANECER** en el área de la endoscopia hasta que sea dado de alta. No se le permite conducir, tomar un taxi o dejar el centro de endoscopia solo. Si no tiene un conductor responsable con usted, su examen será cancelado y cambiado a otro día. Por favor planea para que usted y su conductor estén en el centro durante 2 a 4 horas.

**\*\*Tenga en cuenta que posiblemente le podrían llamar el día de su examen para venir más temprano. Asegúrese que su método de transporte esté disponible durante TODO el día.**

\*\*\*Si no sigue estas instrucciones, su colonoscopia será cancelada\*\*\*

**Por favor llame a nuestra oficina al (770)214-2800 si tiene más preguntas.**