

Colonoscopia con Plenvu

Deberá recoger su preparación en la farmacia lo más antes posible. La farmacia solo retendrá la receta durante 6 días después de recibirla.

5 días antes de su colonoscopia:

- Deje de tomar Coumadin/Warfarina, Plavix/Clopidogrel, Brilinta/Ticagrelor y Effient/Prasugrel.
- NO** tome medicamentos que detengan la diarrea (**Loperamida, Imodium, Subsalicilato de Bismuto, Kaopectate o Peptobismol, etc.**).
- Si toma **analgésicos** (medicamentos para el dolor) o tiene problemas con el **estreñimiento**, se recomienda tomar 1-2 tapas llenas de **Miralax** diariamente.
- NO** tome suplementos de fibra como **Metamucil, Citrucel** o productos con **hierro** incluyendo multivitaminas.

2 días antes de su colonoscopia:

Deje de tomar Eliquis/Apixaban, Xaralto/Rivaroxaban, Pradaxa/Dabigatran.

1 día antes de su colonoscopia:

Seguirá una **dieta de líquidos claros todo el día** (sin alimentos sólidos, productos lácteos y nada de alcohol). Beber en mínimo 8 onzas de líquidos claros cada hora después de despertar.

LÍQUIDOS CLAROS PERMITIDOS:

Jugo de manzana o uva blanca sin pulpa	Agua, aguas saborizadas (nada rojo)
Té (sin crema o crema no láctea)	Soda (nada rojo)
Café (sin crema o crema no láctea)	Ginger ale
Bebida Crystal Light (nada rojo)	Paletas sabor de fruta (nada rojo)
Postres de gelatina (sin fruta o cobertura)	Kool-Aid (nada rojo)
Caramelo duro	Caldo de carne o pollo (puro caldo)
G2 Gatorade/Powerade (nada rojo)	

DOSIS 1 a las 4PM:

-Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la bolsa de "Dosis 1" con 16 oz de agua hasta que se disuelva, esto puede tardar de 2-3 minutos. Bébalo por completo dentro de 30 minutos.

-Vuelva a llenar el recipiente con 16 oz de agua pura y bébalo dentro de 30 minutos.

- Continúe bebiendo líquidos claros hasta la segunda dosis.

DOSIS 2 a las 7PM:

-Use el recipiente de mezcla para mezclar el contenido de la "Dosis 2" (bolsa A y B) con 16 oz de agua hasta que se disuelva, esto puede tomar de 2-3 minutos. Bebalo por completo dentro de 30 minutos.

-Vuelva a llenar el recipiente con 16 oz de agua pura y bébalo dentro de 30 minutos.

-Continúe bebiendo líquidos claros durante toda la tarde.

Si tiene heces formadas (popo formado) o tiene alguna inquietud después de su preparación, llame a la oficina.

**Si tiene náuseas o vómitos, puede dejar de tomar la preparación por 1 hora y luego continúe. Si el vómito continúa durante varias horas, deje de beber la preparación y llame al médico de guardia al 770-836-9666 / operador del hospital.

***NO TOMA NADA MÁS DESPUÉS DE LA MEDIANOCHE antes de su examen.** Puede cepillarse los dientes y hacer gárgaras, pero no trague ningún líquido. No tome nada por la boca (**ESTO INCLUYE CHICLE, CAMELOS DUROS Y PRODUCTOS DE TABACO (ESPECIALMENTE TABACO ORAL)**).

Si toma insulina, tome 1/2 de su dosis regular la noche anterior

DÍA DEL EXAMEN:

Puede cepillarse los dientes y hacer gárgaras, pero no trague ningún líquido. No tome nada por la boca (**ESTO INCLUYE CHICLE, CAMELOS DUROS Y PRODUCTOS DE TABACO (ESPECIALMENTE TABACO ORAL)**). Si tiene dentaduras postizas, no las pegue y prepárese para quitárselas antes del examen. Por favor, deje TODAS las pertenencias personales (joyas, teléfonos celulares, billeteras, etc.) en casa o con su conductor. Los teléfonos celulares no están permitidos en el área del examen.

INSTRUCCIONES PARA MEDICAMENTOS:

Traiga una lista de todos sus medicamentos actuales, incluyendo los medicamentos de venta libre.

Si usa insulina o toma medicamentos para la diabetes, no los tome la mañana del examen.

Si su examen es en **El Centro De Endoscopia**: Por favor, tome su medicamento para la presión arterial, convulsiones, ansiedad e inhaladores como de costumbre.

Si su examen es en cualquiera de **los hospitales de Tanner**: El hospital le dará instrucciones durante su llamada telefónica previa a la visita operatoria sobre qué medicamentos tomar y qué no tomar antes de su examen.

TRANSPORTE:

Una persona responsable **DEBE ESTAR PRESENTE** con usted al llegar (Check-In) antes de su colonoscopia y **DEBE PERMANECER** en el área de la endoscopia hasta que sea dado de alta. No se le permite conducir, tomar un taxi o dejar el centro de endoscopia solo. Si no tiene un conductor responsable con usted, su examen será cancelado y cambiado a otro día. Por favor planee para que usted y su conductor estén en el centro durante 2 a 4 horas.

**** Tenga en cuenta que posiblemente le podrían llamar el día de su examen para venir más temprano. Asegúrese que su método de transporte esté disponible durante TODO el día.**

Si no sigue estas instrucciones, su colonoscopia será cancelada

Por favor llame a nuestra oficina al (770)214-2800 si tiene más preguntas.