

Preparación para la EGD

Si utiliza inyecciones o pastillas de Wegovy, Mounjaro, Trulicity, Ozempic o Saxenda, DEJE de tomarlas 7 días antes de su procedimiento. Si toma hierro, DEJE de tomarlo 7 días antes de su procedimiento.

Si toma alguno de los medicamentos GLP-1 mencionados anteriormente, deberá seguir una dieta de líquidos claros durante todo el día previo a su procedimiento.

Jugo de manzana o de uva blanca (sin pulpa)	Té (sin crema)
Café (sin crema)	Bebida Crystal Light (sin color rojo)
Gelatina (sin frutas ni coberturas)	Caramelos duros
Agua, agua saborizada (sin color rojo)	Refrescos (sin color rojo)
G2 Gatorade / Powerade (sin color rojo)	Paletas heladas (sin color rojo)
Kool-Aid (sin color rojo)	Caldo de res o de pollo

5 días antes de su EGD (una vez autorizado por su cardiólogo o médico):

Suspenda el uso de Coumadin/Warfarina, Plavix/Clopidogrel, Brilinta/Ticagrelor y Effient/Prasugrel.

3 días antes de su EGD:

Suspenda el uso de Jardiance y Synjardy.

2 días antes de su EGD (una vez autorizado por su cardiólogo o médico):

Suspenda el uso de Eliquis/Apixabán, Xarelto/Rivaroxabán y Pradaxa/Dabigatrán.

Medicamentos para el reflujo ácido:

7 días antes, SUSPENDA TODOS los inhibidores de la bomba de protones, incluyendo: Omeprazol (Prilosec), Pantoprazol (Prótonix), Esomeprazol (Nexium), Dexlansoprazol (Dexilant), Lansoprazol (Prevacid) y Rabeprazol (Aciphex).

4 días antes: DEJE de tomar todos los bloqueadores H₂, incluyendo: Famotidina (Pepcid/Zantac),

Cimetidina (Tagamet) y Nizatidina (Axid).

24 horas antes: DEJE de tomar TODOS los antiácidos: Roloids, Tums, Mylanta, Maalox, Alka-Seltzer, Pepto-Bismol, Carafate (Sucralfato), etc.

Si utiliza insulina, adminístrese la **Mitad** de su dosis habitual la noche anterior a su procedimiento.

No coma ni beba nada después de la medianoche ni la mañana de su procedimiento.

La mañana de su Procedimiento

Absolutamente ningún producto de tabaco (para fumar, oral o de vapor):

Si utiliza insulina o toma medicamentos para la diabetes, suspéndalos la mañana de su procedimiento. Por favor, traiga una lista de todos sus medicamentos al centro médico (incluyendo tanto los medicamentos recetados como los de venta libre).

Si utiliza dentadura postiza, por favor no la fije con adhesivo y esté preparado para retirarla antes de comenzar su procedimiento. Por favor, deje todas sus pertenencias personales (joyas, teléfonos celulares, billetera, etc.) en casa o con la persona que lo acompaña. No se permite el uso de teléfonos celulares en el área del procedimiento

Si su procedimiento se lleva a cabo en el Centro de Endoscopia, por favor tome sus medicamentos para la presión arterial, las convulsiones y la ansiedad de la manera habitual. Asimismo, continúe utilizando sus inhaladores como de costumbre.

Si su procedimiento está programado en alguna instalación de Tanner, el hospital le indicará qué medicamentos debe tomar y cuáles debe suspender antes del procedimiento durante su llamada telefónica preoperatoria.

Transporte:

Una persona responsable DEBE estar presente con usted durante el registro de ingreso, antes de su colonoscopia,

DEBE permanecer en el área de endoscopia hasta que se le dé el alta. No tiene permitido conducir, tomar un taxi ni abandonar el centro de procedimientos sin compañía. Si no acude acompañado por un conductor responsable, su procedimiento será reprogramado. Por favor, tenga en cuenta que usted y su conductor deberán permanecer en el centro entre 2 y 4 horas.

Por favor, asegúrese de que su transporte esté disponible durante todo el día, ya que es posible que se le pida llegar más temprano el día de su procedimiento.

*****Si usted no sigue estas instrucciones su procedimiento sera cancelado*****

Porfavor de llamar ala officina (770)-214-2800 si tiene una pregunta.

Si llama despues de hora de trabajo llame a este number (770)836-9666

3-9-26